

## Bröstmjölk ersättning till barn vid misstänkt eller etablerad allergi

Produktnamn	Energi (kcal/100 ml)	Protein g/100 ml	Fettsyror <sup>1, 2</sup> 1. Omega 3 och 6 2. MCT	Järn mg/100 ml	Kalcium mg/100 ml	Pre- eller Probiotika	Övrigt
<b>Bröstmjölk ersättning 0-6 månader</b>							
Althéra	67	1,7	X	0,7	66		Hydrolyserat vassleprotein. Innehåller laktos.
Nutramigen 1 LGG	68	1,9	X	1,2	77	Probiotika	Hydrolyserat kaseinprotein.
Pepticate	67	1,6	X	0,5	47	Prebiotika	Hydrolyserat vassleprotein. Innehåller laktos.
<b>Bröstmjölk ersättning från 6 månader</b>							
Nutramigen 2 LGG	68	1,7	X	1,1	88	Probiotika	Hydrolyserat kaseinprotein
Pepticate PLUS 2	68	1,6	X	1,0	63	Prebiotika	Hydrolyserat vassleprotein. Innehåller laktos?
<b>Bröstmjölk ersättning 0-12 månader - aminosyrabaserade.</b>							
<b>Används enbart vid svår allergi och malabsorption. Förskrivs enbart efter rekommendation från barnläkare eller dietist</b>							
Alfamino	70	1,9	X <sup>1,2</sup>	0,7	57		Vid svår allergi och intolerans
Alfaré	68	2,0	X <sup>1,2</sup>	0,7	51		Vid malabsorption, mag-tarmsymtom och svår allergi
Neocate LCP	68	1,8	X <sup>1,2</sup>	1,0	66		Vid malabsorption, mag-tarmsymtom och svår allergi
Neocate Syneo	67	1,9	X <sup>1,2</sup>	1,0	79	Pre- och probiotika	Vid malabsorption, mag-tarmsymtom och svår allergi
Nutramigen Puramino	68	1,9	X <sup>1,2</sup>	1,2	64		Vid svår komjölkallergi och multipel födoämnesallergi
Pregestimil	68	1,9	X <sup>1,2</sup>	1,2	78		Vid malabsorption, mag-tarmsymtom och svår allergi

1. Fettsyror (X = innehåller Omega 3 och 6 i varierande grad och kombinationer, se innehållsdeklaration från respektive producent)

2. MCT-fett (X = innehåller medellånga kedjor av fettsyror för underlätta absorption i mag-tarmkanalen)