

CoMiSS – stöd vid misstanke om icke-allergisk överkänslighet mot komjölkprotein

Namn:

Personnummer:

Datum:

Vid allvarliga symtom där kraftig komjölkproteinallergi misstänks ska barnet bedömas på Barnklinik akut. Barn som reagerar allergiskt inom 1–2 timmar efter komjölkintag remitteras efter elimination till Barnkliniken för utredning (följ flödesschemat sid 1). Vid dessa situationer skall CoMiSS inte användas.

Om icke-allergisk överkänslighet mot komjölkprotein ska uteslutas använder du CoMiSS och graderar barnets besvär genom att ringa in lämpligast poäng för varje symtom. Poängen summeras och noteras längst ner på formuläret.

	Poäng:			
Symtom:				
Gråt*	0	≤ 1 timme/dag		
	1	1 till 1,5 timmar/dag		
	2	1,5 till 2 timmar/dag		
	3	2 till 3 timmar/dag		
	4	3 till 4 timmar/dag		
	5	4 till 5 timmar/dag		
	6	≥ 5 timmar/dag		
Kräkningar	0	0 till 2 episoder/dag		
	1	≥ 3 till ≤ 5 med liten volym		
	2	> 5 episoder på >1 tesked		
	3	> 5 episoder på hälften av intagen mat vid färre än hälften av måltiderna		
	4	Regelbundna kräkningar med små volymer > 30 min efter varje måltid		
	5	Kräkningar med hälften till hela matintaget vid minst hälften av alla måltider		
	6	Kräkningar med hela matintaget efter varje måltid		
Avföring	4	Hård avföring		
	0	Normal avföring		
	2	Mjuk avföring		
	4	Flytande avföring, om ej relaterat till infektion		
	6	Vattning avföring		
Hudsymtom		Atopiskt eksem	Huvud-hals-bål	Armar-händer-ben-fötter
		Saknas	0	0
		Ringa	1	1
		Måttligt	2	2
		Allvarligt	3	3
		Urtikaria	Nej 0	
			Ja 6	
Andningssymtom	0	Inga andningssymtom		
	1	Diffusa symtom		
	2	Lätta symtom		
	3	Allvarliga symtom		

Totalpoäng: _____

* **Gråt** tas bara med om barnet, enl. föräldrarnas bedömning, har gråtit >1 vecka utan annan uppenbar orsak.

Poängskalan går från 0–33. Varje symtom ger max 6 poäng, utom andningssymtom som ger max 3 poäng.

Vid < 12 poäng är symtomen mindre troligt orsakade av komjölk. Sök efter andra orsaker.

Vid ≥ 12 poäng kan symtomen vara komjölkrelaterade (följ flödesschemat sid 1).

RIKSHANDBOKEN BARNHÄLSOVÅRD

Datum: Maj 2021

Utformat efter Vandenplas, Y et al. A workshop report on the development of the Cow's Milk-related Symptom Score awareness tool for young children. Acta Paediatrica 2015.